

Состав и форма выпуска

Мазь для наружного применения.

Активным веществом является гидрохинон монобензиловый эфир. 1 г мази содержит 200 мг гидрохинона и монобензилового эфира.

Эксципиенты: глицерин 86%, безводный эucerин, белый вазелин, вода очищенная.

Фармакологическое действие

Механизм действия гидрохинона монобензилового эфира до конца не изучен. Местное применение препарата животным усилило выведение меланина из пигментных клеток. Механизм действия препарата также может заключаться в ингибировании выработки меланина. Изменение цвета кожи происходит после 1-4 месяцев использования, полное изменение цвета может произойти через 9-12 месяцев.

Показания к применению

Лечение гиперпигментации (дерматозов с гиперпигментацией), вызванной избытком меланина и депигментацией нормально пигментированных фрагментов кожи у пациентов с альбинизмом.

Способ применения

Применять пигментированную мазь 2-3 раза в день, не дольше, чем на 3 месяца. Однако, если удовлетворительные результаты не будут получены после этого времени, лечение следует прекратить. После получения удовлетворительной степени обесцвечивания кожи, лекарство используется в качестве поддерживающей терапии, обычно два раза в неделю.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ. Не используйте в лечении гиперпигментных пятен, таких как гиперпигментация, вызванная легкой аллергией после использования определенных духов, меланодермии беременных (хлоазма), гиперпигментация, вызванная воспалением кожи. Препарат не эффективен при лечении пигментных родинок, меланом и изменений окраски, вызванных красителем, отличным от меланина.

Меры предосторожности

Избегайте чрезмерного солнечного света во время использования. Во время воздействия солнечного света на протяжении всей жизни после использования этого препарата используйте кремы с УФ-фильтром. Не рекомендуется применять препарат людям с чрезмерно сухой кожей или склонным к аллергическим реакциям.

Нежелательное действие

Преходящий зуд или жжение (обычно исчезает через несколько дней), жжение, покраснение кожи, раздражение, просачивание, постоянное повреждение меланоцитов. Постоянное жжение, покраснение кожи, раздражение, возникновение слизистых изменений являются показанием к прекращению лечения.

Беременность и кормление грудью

Из-за содержания производного гидрохинона не рекомендуется использовать препарат во время беременности. Следует соблюдать осторожность, если препарат используется во время кормления грудью - неизвестно, из организма ли гидрохинон монобензиловый эфир в материнском молоке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 С.

Условия продажи

Без рецепта.